

Komentář k článku

„Nové trendy v přístupu k léčbě diabetu 2. typu – postřehy a benefity v ambulanci diabetologa“

Milan Kvapil

Průměrná, samostatně fungující diabetologická ordinace má v České republice v péči okolo 1 000 pacientů. Pouze 7 % registrovaných diabetologických ambulantí pečovalo o více než 2 000 pacientů s diabetem.

Ačkoliv v současnosti již máme celkem přesná a recentní data z „diabetologického


registru“ o struktuře populace diabetiků v České republice a ze starších datových souborů pojištěnců Všeobecné zdravotní pojišťovny máme i poměrně přesný obraz o péči o diabetiky podle jednotlivých krajů, je odborný text popisující demografickou strukturu a prevalenci farmakologické tera-

pie v jedné ambulanci ojedinelý. Přitom referovaná ambulance, jak z uvedeného vyplývá, je spíše výjimkou stran počtu sledovaných osob, což činí předkládanou analýzu o to cennější. Proto by mohlo být zajímavé, jak koreluje tato analýza s daty platnými pro celou českou republiku.

Graf 1. Jaký je vývoj absolutního počtu a relativního počtu osob léčených vybranými antidiabetiky? Vývoj odpovídá trendům využití moderní terapie. Lze usoudit z oploštění nárůstu počtu pacientů léčených gliptiny, že tuto terapii dostává každý, kdo splňuje kritéria indikačního omezení a současně u něj terapie prokazatelně zlepšuje kompenzaci. Pro porovnání graf týkající se glitazonů/pioglitazonu (doposud jediné využitelné farmakologické intervence inzulinové rezistence)

Léčba perorálními antidiabetiky v letech 2010–2020

Počet pacientů s antidiabetickou léčbou léčených daným léčivem:



Absolutní počet a prevalence předepisování glitazonů, gliflozinů a gliptinů. Podíl pacientů (%) s antidiabetickou léčbou léčených daným léčivem = prevalence. Jako základ pro výpočet 100 % = diabetici, kteří mají v daném roce záznam o antidiabetické léčbě (ATC skupiny A10A a/nebo A10B). Zdroj dat: NRHZS 2010–2020.