

OVĚŘENÉ NUTRIČNÍ ŘEŠENÍ PRO CITLIVÁ BŘÍŠKA

S EFEKTEM UŽ OD 1. DNE^{1,2*}

ÚLEVA
OD ZÁCPY
A KOLIKY^{1*}



- β-palmitát
- Částečně hydrolyzovaná syrovátková bílkovina
- Prebiotická směs scGOS/lcFOS (9:1)

SNÍŽENÍ
EPIZOD
REGURGITACE^{2*}



- Karubin
- Prebiotická směs scGOS/lcFOS (9:1)
- Postbiotika získaná fermentačním procesem Lactofidus™

REFERENCE: 1. Savino F, et al. Acta Paediatr. 2003;92:86-90. 2. Wenzl TG, et al. J Pediatr. 2003;111:e355-e359. *Nutrilon Comfort & Colics snižuje počet epizod koliky o 1,8 denně >50 klinických studií, >100 publikací. Nutrilon AR prokazuje klinické snížení epizod regurgitace o 78 % již od 1. dne. **DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:** Kojení je pro dítě to nejlepší a zdravá a vyvážená strava matky je při kojení velmi důležitá. Rozhodnutí nekojit či přestat kojit může být nevratné. Počáteční kojenecká výživa Nutrilon Lactose Free je určena dětem od narození, nemohou-li být kojeni. Kojenecká výživa by měla být používána na základě doporučení lékaře nebo osoby kvalifikované v oblasti výživy lidí, farmacie nebo péče o matku a dítě a měly by být zvaženy i její finanční dopady. Pro zdraví kojení je důležité důsledně dodržovat doporučený postup přípravy a dávkování a použití kojenecké výživy uvedený na obale. Přípravky Nutrilon Comfort & Colics, Nutrilon AR a Nutrilon Nutrilon jsou potraviny pro zvláštní lékařské účely a jsou určeny pro řízenou dietní výživu při uvedených indikacích, musí být používány pod dohledem lékaře. Potravina pro zvláštní výživu. Způsob použití a další informace na www.nutriklub.cz a na infolince 800 110 000. 03/2026. BF313697.