

svědění očí , termín u lékaře , antihistamin

, nosní sprej



Překonejme spolu alergie

Překonejte současnou i budoucí zátěž
v podobě respirační alergie u dětí
a přerušte cyklus respiračních alergií
v raném věku, řešte podstatu problému
pomocí ALK SLIT tablet*

ACARIZAX®

GRAZAX®

ITULAZAX®

RAGWIZAX®



Zastoupení v ČR:

ALK Slovakia s.r.o. – odštěpný závod
Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4
tel.: + 420 233 312 907
www.alk.net/cz

CZ-TBL-2600003

Datum přípravy materiálu: únor 2026

*ALK SLIT tablety se indikují pro užití v následujících věkových skupinách ACARIZAX® u dětí (5-17 let) a dospělých s klinickou anamnézou a pozitivním testem citlivosti na roztocě domácího prachu (kožní prick test a/nebo specifické IgE) se středně těžkou až těžkou alergickou rinitidou způsobenou roztoci domácího prachu přetrvávající i přes léčbu přípravky ulevujícími od příznaků a dospělých (18-65 let), kteří mají alergické astma způsobené roztoci domácího prachu¹, GRAZAX® jako onemocnění modifikující léčba rinitidy a konjunktivitidy vyvolané travním pylem u dospělých pacientů a dětí (starších 5 let) s klinicky významnými příznaky a diagnostikované pozitivním kožním prick testem a/nebo specifickým IgE testem na travní pyl²; ITULAZAX® k léčbě dospělých a dětí (od 5 let) se středně závažnou až závažnou alergickou rinitidou a/nebo konjunktivitidou vyvolanou pylem ze skupiny alergenů homologních s břízou³; RAGWIZAX® u dospělých a dětí (od 5 let) na alergickou rinitidu způsobenou pylem ambrozie s konjunktivitidou nebo bez ní přes užívání léků ulevujících od příznaků⁴. Pro více informací viz souhrn údajů o přípravcích ACARIZAX®¹, GRAZAX®², ITULAZAX®³, RAGWIZAX®⁴.

ALK

Rise Above Allergies
ALK SLIT-tablets*